

Blincyto (blinatumomab) som konsolideringsbehandling vid akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna

NT-rådets yttrande till regionerna 2025-03-24

Rekommendation i väntan på pågående utredning

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

- att avvakta med Blincyto som konsolideringsbehandling vid ALL hos vuxna till dess att NT-rådet har genomfört en sammanvägd bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering.

Om läkemedlet

Blincyto är indicerat som monoterapi som en del av konsolideringsbehandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad Philadelphia-kromosomnegativ CD19-positiv pre-B-cells ALL.

Det finns även en tidigare rekommendation från NT-rådet om att avstå från generell användning av Blincyto vid ALL hos barn och att Blincyto kan användas som bryggbehandling till barn och vuxna med ALL inför allogen stamcellstransplantation.

Motivering

NT-rådet beslutade 2025-01-15 att Blincyto som konsolideringsbehandling vid ALL hos vuxna ska omfattas av nationell samverkan. Det innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation om dess användning till regionerna. För att NT-rådet ska kunna göra en bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behövs en hälsoekonomisk värdering. NT-rådet har beställt en sådan värdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Till dess att NT-rådet kan göra en sammanvägd bedömning och avge en rekommendation, rekommenderas regionerna att avvakta med införande av Blincyto som konsolideringsbehandling vid ALL hos vuxna för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlig hantering i landet.