



# Kymriah (tisagenlecleucel) vid follikulärt lymfom

NT-rådets yttrande till regionerna 2023-01-13

## Rekommendation i väntan på pågående utredning

### NT-rådets rekommendation till regionerna är:

- att avvakta med Kymriah vid recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom till dess att NT-rådet har genomfört en sammanvägd bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering

## Om läkemedlet

Kymriah är sedan tidigare avsett för behandling av akut lymfatisk B-cellsleukemi (ALL) och diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). NT-rådet har utfärdat en rekommendation om att Kymriah kan användas för ALL samt en rekommendation om att inte använda Kymriah vid DLBCL.

Kymriah har under 2022 även blivit godkänt av EMA för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom efter två eller flera linjer av systemisk behandling.

## Motivering

NT-rådet beslutade 2022-01-12 att Kymriah vid follikulärt lymfom omfattas av nationell samverkan. Det innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation om dess användning till regionerna. För att NT-rådet ska kunna göra en bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behövs en hälsoekonomisk värdering. NT-rådet har beställt en sådan värdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Till dess att NT-rådet kan göra en sammanvägd bedömning och avge en rekommendation, rekommenderas regionerna att avvakta med införande av Kymriah vid follikulärt lymfom för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlig hantering i landet.