

# Reblozyl (luspatercept) vid betatalassemi

NT-rådets yttrande till regionerna 2024-11-11

## Rekommendation och sammanvägd bedömning

**NT-rådets rekommendation till regionerna är:**

- att inte använda Reblozyl vid betatalassemi

## Om läkemedlet

Reblozyl är indicerat för två användningsområden:

- behandling av vuxna patienter med anemi associerad med transfusionsberoende och icke-transfusionsberoende betatalassemi.
- behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi orsakad av myelodysplastiskt syndrom (MDS) med mycket låg, låg och medelhög risk.

## Motivering

NT-rådet beslutade 2019-03-05 om nationell samverkan för Reblozyl vid betatalassemi. För att NT-rådet ska kunna göra en bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behövs en hälsoekonomisk värdering. Företaget har valt att inte bidra med ett hälsoekonomiskt underlag för Reblozyl vid betatalassemi. Det kan därför inte göras en bedömning av om behandlingen är kostnadseffektiv.

NT-rådet har 2024-07-28 utifrån en hälsoekonomisk värdering publicerat en rekommendation om att inte använda Reblozyl vid myelodysplastiskt syndrom eftersom behandlingen inte bedömdes kostnadseffektiv.

Det finns tre nivåer för NT-rådets rekommendationer till regionerna: att läkemedlet bör användas, kan användas eller att läkemedlet inte ska användas. Rekommendationen i det här fallet är att inte använda Reblozyl vid betatalassemi eftersom kostnaden för behandlingen är hög och hälsoekonomisk värdering saknas.